



SEXO

ORAL



Guía para disfrutar del
sexo oral de una forma más
segura y no rayarte en
el intento.



SEVILLA
CHECKPOINT

Las mayores dudas sobre el sexo surgen con las felaciones.



¿Pueden transmitir alguna ITS?

¿Hay riesgo para VIH?

¿Cómo puedo reducir riesgos?

¿Y si soy alérgico al látex?

¿Escupo o trago?



¿Y si me lavo los dientes justo después de que se me corran en la boca?

¡Relax!

te traigo la guía definitiva para disfrutar del sexo oral de una forma más segura y no rayarte en el intento.


Sigue leyendo...

Empecemos hablando de las felaciones en las que has decidido usar el preservativo.

Si el preservativo ha estado presente desde el principio NO existe ningún tipo de riesgo para esta práctica.

Sin embargo, es cuando te olvidas el condón o decides no usarlo que te surgen las dudas y las preguntas sobre el estado de tu salud sexual.



A stylized illustration of a penis, colored in shades of pink and purple, with a thick, dark brown condom covering it. From the base of the penis, several thick, pinkish-purple liquid drips are falling downwards. The background is a solid yellow color.

Si en la felación no hay condón ni eyaculación en la boca, NO se considera una práctica de riesgo para el VIH excepto que existiese otra ITS activa en la boca de quien hace la felación pues podría tener una herida y facilitar la transmisión.

iiii OJO, AMIGUI !!!!

Aunque no exista riesgo para VIH, existen otras ITS como la clamidia, sífilis y gonorrea, entre otras. Estas ITS pueden estar alojadas en la garganta de quién hace la felación o en el pene de quien la recibe y se transmiten por contacto.

Si existe eyaculación, el riesgo para VIH sería para quien recibe el semen en su boca en caso de tener alguna herida sangrante u otras ITS activas en ella.

Para la personas que recibe la felación, NO hay riesgo para VIH ya que solo está en contacto con la saliva y esta no transmite el virus.

El riesgo de infectarse de VIH vía oral es muy bajo, ya que la boca sana muy rápido y en la saliva existen unas enzimas que nos protegen de este virus. Por lo tanto, una buena salud bucal es maravilloso para reducir riesgos.

Como dije antes, existen otras ITS y en este caso, estarían en riesgo tanto la persona que hace la felación como quién la recibe.



Si no hay protección en la felación, puedes tomar ciertas medidas para reducir riesgos. Por ejemplo, evitar cepillarte los dientes 3 horas antes de realizar la felación e inmediatamente después, ya que tanto el cepillo de dientes como el hilo dental pueden abrir o reabrir pequeñas heridas.

Del mismo modo, se aconseja no usar enjuagues con alcohol ni colutorios que puedan irritar la boca, ya que esto podría romper la protección natural de tu saliva y tu higiene bucal.

Así que, si necesitas enjuagarte después de haber realizado una felación, te aconsejo hacerlo con abundante agua.



¿TRAGO. ⇒ SCUPO?

Al tragar corres el riesgo de que en tu esófago tengas alguna herida indolora y pueda haber riesgo de infección tanto para VIH como para otras ITS.

Lo recomendable es escupir y enjuagarse con abundante agua sin usar cepillo de dientes ni enjuague bucal para no dañar la protección natural de la boca.



**Y esto es todo por hoy.
Si necesitas saber más o consultar tus dudas,
no dudes en ponerte en contacto con nuestro
cibereducador vía Whatsapp al 620 077 421.**

ADHARA SEVILLA CHECKPOINT
C/ Pagés del Corro 89-91, Local 3
41010 Sevilla · Tlf: 954 981 603

NO8DO

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

Bienestar Social y Empleo

Dirección General de Salud Pública
y Protección Animal

Servicio de Salud



Fast-Track
Sevilla
por una ciudad sin VIH/sida